

Siebentes Verzeichniß

jener Pflanzen, welche bei P. M. Spiz, Altstadt, Rittergasse, No. 539 zum Tausch oder Kauf *) unter den im Kratos — und der botanischen Zeitung bekannt gemachten Bedingungen vorrätbig sind, und nur dann ausgefolgt werden, wenn alle Einsendungen kostenfrei geschehen, und zur Besorgung der Gegensendungen verhältnißmäßige Geldvorschuße erfolgen. Die Fortsetzung dieses Verzeichnisses folgt nach Erlag von 12. fr. C. M. oder 8 Exemplaren einer ausgewählten Pflanzenart unter den bekannten Bedingungen.

Anthoxanthum asperum. Mann. ³⁵) (Mann.) — *Anthyllis tetraphylla*. L. (Kostelecky.) — *Antirrhinum* Osyris. Reusch. (Kostelecky.) — *repens*. (Maly.) — *Aquilegia vulgaris*. L. (Prag. Kostelecky.) — *Arabis conferta*. Willd. (Kostelecky.) — *caucasica*. W. (Günther.) — *Arbutus uva ursi* L. (Niesky. Burckhardt.) — *Arctotis calendulacea*. L. (Kostelecky.) — *Arenaria austriaca*. L. (Oestreichische Schneeberg. Reinegger.) — *heteromalla*. P. (St. Ivan beraun. Kr. Kostelecky.) — *juniperina*. Villars. (non Linne.) welche bei Genf wächst, wird gewöhnlich für *A. grandiflora*. Allion ausgegeben, und selbst von Candolle dafür erklärt; doch mit Unrecht, so ähnlich auch beide sind, so weicht die *A. juniperina* Villars doch wesentlich von *A. grandiflora* All. ab. Nach Bernhards ist es die Villars'sche Pflanze, welche von Candolle zu *A. triflora* L. gezogen wird, von Willdenow aber mit Unrecht zu *A. grandiflora*. Hornung. — *verna*. L. (Gainsfahnen in Oestreich auf felsigen Bergen. Reinegger.) — *polygonoides*. Wulf. (Gráz. Speckmöser.) — *Arnopogon picroides*. L. (Kostelecky.) — *Artemisia biennis*. Willd. (Kostelecky.) — *glacialis*. L. vom Herrn. D. v.

*) Die Centurie à 4 fl. C. M., nebst Vergütung aller Unkosten. Auch werden naturhistorische Schriften anstatt Geld angenommen. Wer mehr als eine Centurie auf einmal abnimmt, erhält die Centurie um 3 fl. 30 fr. C. M.

³⁶) *Anthoxanthum panicula spiciforme, oblonga, basi interrupta; culmo vaginisque asperis*. Mann. Crescit in sylvis Bohemiae. Floret Jul. Aug. 24. Mann.

Braun ist *A. mutellina* Villars, Benesch. — *glauca*, Pallas. (Günther.) — *saxatilis*, W. et K. (Günther.) — *laciniata*, Fischer, (Günther.) — *Arthonia astroidea tynnocarpa*, (Prag. Mann.) — *obscura*, (Prag. Mann.) — *astroidea*, Achar. (Mann.) — *Arum maculatum*, L. (Konneberg, Thon.) — *Arundo Langsdorfii*, (Günther.) — *Asclepias angustifolia* W. (Chotek.) — *Asparagus officinalis sativus*, Miller. (Huzelmann.) — *Asperula laevigata*, L. (Kostelecky.) — *rivularis*, Sib. et Smith. (Brünn. Hochstetter.) — *Aspidium alpinum*, (Untersberg. Hinterhuber.) — *Lonchitis*, L. (Salzburg. C. Bartenstein.) — *Oreopteris*, (Bartenstein. — Jena. Thon.) — *rigidum*, (Untersberg. Hinterhuber.) — *exaltatum*, (Günther.) — *Aster pannonicus*, Jacq. (Möniz in Mähren. Hochstetter.) — *praecox*, Willd. (Günther.) — *salignus*, W. (Breslau. Wimmer.) — *Astragalus adsurgens*, (Günther.) — *arenarius*, L. (Lausitz. Burckhardt, Breslau. Wimmer.) — *montanus*, L. (Untersberg bei Salzburg. Hinterhuber.) — *pilosus*, L. (Prag. Sieber.) — *boeticus*, L. (Gerhard.) — *hamosus*, L. (Kostelecky.) — *mons-pessulanus*, L. (Speckmoser.) — *cymbicarpos*, Brot. (Kostelecky.) — *Astrantia major*, L. (Chotek.) — *Athyrium montanum*, (Untersberg bei Salzburg. Hinterhuber.) — *Atriplex campestris*, Koch. (Prag. Masner.) — *laciniata*, L. (Prag. Leitner. Wien. Reinegger.) — *littoralis*, L. (Kostelecky.) — *oblongifolia* W. et K. (Brünn. Hochstetter.) — *portulacoides*, L. (Masner.) — *Avena brevis*, Roth. (Kostelecky.) — *Barbula muralis breviseta*, Opiz. (Prag. Masner.) — *fallax*, (Reinegger.) — *Bartramia ithyphylla*, Briedel. (Breslau. Wimmer.) — *Bellium bellidioides*, L. (Günther.) — *Beta Cyclo*, L. (Kostelecky.) — *Bidens serrulata*, Desf. (Speckmoser.) — *leucantha*, W. (Kostelecky.) — *heterophylla*, Orteg. (Maly) — *Biscutella raphanifolia*, Poir. (Gerhard.) — *Blitum tataricum*, Müller. (Kostelecky.) — *Borrera tenella leptalea*, (Prag. Mann.) — *tenella*, (Prag. Mann.) — *Brachystemum lanceolatum*, (Günther.) — *Brachytrichum saxatile*, Röhling. (in saxosis Ratisbonae, Stockar v. Neuform.) — *Brassica austriaca*, W. (Reinegger.) — *Bromus confertus*, Bstr. (Weihe.) —

madritensis. L. (Weihe.) — racemosus. L. (Breslau. Wimmer.) — tortilis. Presl. (Maly.) — asper. L. von Opiz ist *Triticum caninum*. L. Mann. — Mölf in Oesterreich Reinegger.) — purgans. L. (Kostelecky.) — pendulinus. Sesse. (Kostelecky.) — geniculatus. L. (Kostelecky.) — *Browallia elata*. L. (Chotek.) — *Bryonia alba*. L. (an Zäunen bei Regensburg. Stockar v. Neuform.) — *Bryum contortum*. (Reinegger.) — violaceum vom Hrn. Professor Reinegger ist *B. julaceum*. Maly. — *Bubon buchtormense*. (Kostelecky.) — *Bupthalmum grandiflorum*. (Speckmoser.) — *Bupleurum tenuissimum*. L. (Möniz brünn. Kr. in Mähren. Hochstetter.) — *Cacalia albifrons*. L. (Wiesenberger Gebürg in Mähren. Hochstetter. Sudeten. Masner et Wagner. Elbefall ebend. Benesch.) — *Calceolaria pinnata*. L. (Kostelecky.) — *Calendula arvensis*. L. (Kostelecky. Reinegger.) — sicula. W. (C. Bartenstein.) — hybrida. L. (Kostelecky.) — stellata. Cav. (Kostelecky.) — *Calicium pusillum*. Flörke. deutsch. Flecht. (Breslau. Wimmer.) — *Callitriche autumnalis* L. vom Hrn. M. C. Ritter v. Eisenstein ist *Montia fontana*. L. Mann. — *Camelina dentata*. (Böheim. Mann.) — *Campanula Speculum*. L. (C. Bartenstein.) — pusilla. Haenke. (Grätz. Speckmoser.) — rotundifolia. L. (Admont in Steyermark. Sommerauer.) — Erinns. L. (Kostelecky.) — ucrainica. Sprengl. (Kostelecky. Gerhard.) — *Camphorosma monspeliaca*. L. (Kostelecky.) — *Canna indica*. L. (Speckmoser.) — *Capsicum annuum*. L. (Speckmoser.) — *Cardamine sylvatica*. Link vom Hrn. Rentmeister Prochaska ist *C. pratensis*. L. Mann. — H. M. C. Mann's Berichtigung ist falsch, denn es ist weder *C. sylvatica*. Link, noch *C. pratensis*. L., sondern *C. amara*. L. Prochaska. — *Cardiospermum Halicacabum*. L. (Kostelecky.) — *Carduus acanthoides*. L. (Schlesien. Grabowsky.) — marianus. L. (Masner. — Schönbühl in Oesterreich. Reinegger.) — personatus. Jacquin. (Sudeten. Masner.) — canus. L. (Neuhof caslauer Kr. Chotek.) — oleraceus. L. (Grätz. Speckmoser.) — *Carex atrata*. L. vom Hrn. Jähnrich Bracht ist *C. saxatilis*. L. Weihe. (Niesengebirg. Masner.) — firma. Host. vom Hrn. Friedr. Mayer ist *C. praecox*. Jacq. Weihe. — vesi-

caria var. (Leipzig. Gerhard.) — dioica. L. (Reinegger.) — Michellii. Host. (Prag. Mann.) — pallescens. L. (Karlstein. beraun. Fr. Kostelecky.) — multiflora. Schkuhr. (Günther.) — vulpina. L. (Linz. Brittinger.) — fœnea. W. (Günther.) — *Catharinea undulata*. (Eöln am Rhein. Sehlmeier.) — *Caucalis latifolia*. L. (Jena Thon.) — *leptophylla*. L. (Kostelecky.) — *orientalis*. L. (Maly.) — *Celosia cristata*. L. (Adamowsky.) — *Celsia Arcturus*. L. (Kostelecky.) — *Celtis australis* L. vom Frn. M. D. Maly ist *C. occidentalis*. L. Mann. — *Cenchrus tribuloides*. L. (Kostelecky.) — *Cenomyce bacilaris macilenta*. (Böheim. Mann.) — *decorticata*. Flörke. (Böheim. Mann.) — *degenerans*. Flörke. (Harz. Mann.) — *fimbriata cornuta*. (Prag. Mann.) — *molariformis*. Achar. (Prag. Mann.) — *pytirea*. Flörke. (Prag. Mann.) — *pytirea acuminata*. Achar. (Prag. Mann.) — *pyxidata simplex*. (Prag. Mann.) — *extensa*. Flörke. (Prag. Mann.) — *papillaria*. (Prag. Mann.) — *taurica*. (Schneefoppe. Benesch.) — *pyxidata syntheta*. Achar. (Prag. Mann.) — *squammosa*. Flörke. (Harz. Mann.) — *alcicornis*. Flörke. (Prag. Mann.) — *Centaurea cyanus fl. albo*. (Böhmischaidcha. Formanek.) — *Cyanus flore atropurpureo*. Benesch. (Böhmischaidcha. Formanek.) — *Cyanus flore roseo*. (Böhmischaidcha. Formanek.) — *nigrescens*. W. (Chotek.) — *aspera*. L. (Kostelecky.) — *salmantica*. L. (Eöln. Sehlmeier.) — *sicula*. L. (Kostelecky.) — *Verutum*. L. (Kostelecky.) — *Centrospermum Chrysanthum*. Sp. (Gerhard.) — *Ceranium Wulfenii*. (Adriatisches Meer. C. Bartenstein.) — *Cerastium vulgatum*. L. (Prag. Kostelecky.) — *Cerinthe maculata*. Allion. (C. Bartenstein.) — *Chaerophyllum Cicutaria* (Untersberg bei Salzburg. Hinterhuber.) — *hirsutum*. (Sudeten. Masner.) — *Cheiranthus annuus*. L. (Speckmoser. Burckhardt. Huzelmann.) — *graecus*. Desf. (Maly.) — *tricuspidatus*. L. (Kostelecky.) — *Chenopodium Botrys*. L. (Sehlmeier.) — *crassifolium*. Desf. (Kostelecky.) — *rubrum*. L. (Unterlauff. Burckhardt.) — *urbicum*. L. (Böheim. Mann.) — *Vulvaria*. L. (Eöln am Rhein. Sehlmeier.) — *Chrysanthemum Coronarium radio albo*. (Masner.) — *inodorum*. Smith. (Reinegger.) — *multifidum*. Desf. (Günther.) — *frutescens*. L.

(Speckmoser.) — *pinuatifidum*. L. (Kostelecky.) — *carinatum*. Schousb. (Speckmoser. A. Bartenstein.) — *Chrysosplenium oppositifolium*. L. (Eisenach. Thon. Eöln am Rhein. Sehlmeyer.) — *Cicuta virosa*. L. (Schlesien. Grabowsky.) — *Cineraria cordifolia*. L. fil. (Grätz. Speckmoser.) — *crispa*. L. (Schlesien. Grabowsky.) — *maritima*. L. (Masner. Maly.) — *Circaea intermedia*. Ehrh. (Eisenach. Thon.) — *Cistus oelandicus*. L. (Untersberg bei Salzburg. Hinterhuber. Grätz. Speckmoser.) — *Cladosporium epiphyllum*. Nees. (an abgefallenen Eichenblättern um Prag. Opiz.) — *Clematis Vitalba*. L. (Chotek.) — *Cluytia pulchella*. L. (Sehlmeyer.) — *Cnicus serratuloides*. (Stern. Maly.) — *tataricus*. (Schlesien. Grabowsky.) — *arvensis*. (Böhmischböhmen. bunzl. Kr. Prochaska.) — *Cnidium Silaus*. Spr. (Schlesien. Grabowsky.) — *Collema limosum*. Achar. (Prag. Mann.) — *pulposum*. (Prag. Mann.) — *crispum*. (Böheim. Mann.) — *Colutea orientalis*. Lam. (Mann.) — *Commelina africana*. L. (Kostelecky.) — *pallida*. W. (Kostelecky. Adamowsky.) — *Conferva amphibia*. Röbling. (Prag. Mann.) — *gigantea*. Sauter. (Zellersee in Salzburg. Sauter.) — *muralis*. (Prag. Benesch.) — *aegagropila*. (baltisches Meer. Mann.) — *Convallaria verticillata*. L. (Böhmischböhmen. Prochaska.) — *Convolvulus siculus*. L. (A. Bartenstein.) — *sibiricus*. (C. Bartenstein.) — *Coreopsis tinctoria*. (Maly.) — *verticillata*. L. (Sehlmeyer.) — *Correa alba*. L. (Sehlmeyer.) — *Cornus sericea*. Herit. (Maly.) — *Coronilla coronata*. L. (Grätz. Speckmoser.) — *montana*. Scopoli. (Jena. Thon.) — *Emerus*. L. (Sehlmeyer. Berchtoldsdorf bei Wien. Piwocki.) — *Corrigiola littoralis*. L. (Laufz. Burckhardt.) — *Corydalis bulbosa albiflora*. (Prag. Mann.) — *albiflora*. (Mölk. Reinegger.) — *Corylus Columna*. L. (Maly.) — *Crassula coccinea*. L. (Chotek.) — *rubens*. L. (Kostelecky.) — *Crataegus pyrifolia*. Aiton. (Maly.) — *Crepis parviflora*. Mönch. (Kostelecky.) — *rubra*. L. (Sehlmeyer.) — *nemausensis*. Gouan. (Kostelecky.) — *Crucianella anomala*. Bieberst. (Weihe.) — *Cucumis sativus*. L. (Adamowsky.) — *Cucurbita Lagenaria*. L. (Masner.) — *Cuphea viscosissima*. Jacq. (Kostelecky.) — *Cuscuta Epithymum*. L. (Eöln am Rhein.

Sehlmeyer.) — *europaea*. L. (Eöln am Rhein. Sehlmeyer.) — *Cyclamen europaeum*. L. (Eichhörn brunn. Fr. Hochstetter. — Chotek.) — *Cynosurus cristatus*. L. (Eöln am Rhein. Sehlmeyer.) — *Cytisus sessilifolius*. L. (Kosteletzky. Sehlmeyer.) — *canescens*. Maly. (Melnitz in Böhme. Maly.) — *Dactylis scabra*. Mann. ³⁷⁾ (Böhme. Mann.) — *Daphne Laureola*. L. (Dornbach bei Wien. Eisenstein. — Sehlmeyer.) — *Datura Stramonium*. L. (Prater nächst Wien. Kerndl.) — Metel. L. (Chotek.) — *Delphinium Ajacis flore pleno*. (Huzelmann.) — *Ajacis flore pleno roseo*. (Adamowsky.) — *Ajacis nanum flore albo*. (Maly.) — *Ajacis nanum flore cinereo*. (Maly.) — *Ajacis nanum flore coeruleo*. (Maly.) — *Ajacis nanum flore rubro*. (Maly.) — *intermedium*. Aiton. (Schlesien. Grabowsky.) — *Dematium epiphyllum*. (auf Blättern der *Quercus Robur*. L. am Břížaberg bei Prag. Masner.) — *Dianthus alpinus*. L. (Raibling in Steyermarf. Sommerauer.) — *arenarius*. L. (Maly — Brühl bei Wien. Eisenstein.) — *Armeria*. L. (Auenic nächst Prag. Wagner. Eöln am Rhein. Sehlmeyer.) — *plumarius flore pleno*. (Mann.) — *suaveolens*. Sprengl. (Weihen.) — *superbus*. Jacq. (Linz in Oberösterreich. Brittinger.) — *Dicaeoma Carthami*. Huzelmann. (auf *Carthamus tinctorius* L. bei Saaß. Huzelmann.) — *Dicranum falcatum*. (Reinegger.) — *flagellare*. (Reinegger.) — *undulatum*. (Reinegger.) — *purpureum*. (Reinegger.) — *polyssetum*. (Reinegger.) — *virens*. (F. v. Braun.) — *sciuroides*. (Reinegger.) — *Dictamnus albus*. L. (Podbaba nächst Prag. Palliardi. Leopoldsberg bei Wien. Kerndl.) — *Digitalis lanata*. Ehrh. (Chotek.) — *lutea*. L. (Günther.) — *Dorycnium herbaceum*. Villars. (Wien. Eisenstein. Brühl nächst Wien. Piwocki.) — *Draba confusa*. Ehrh. (Kosteletzky.) — *praecox*. Steven. (Prag. Mann.) — *Dracosephalum thymiflorum*. L. (Kosteletzky.) — *Drosera longifolia*. L. (Gräß. Speckmoser. — A. Bartenstein.) — *Dryas*

³⁷⁾ *Dactylis panicula secunda*, glomerata; flosculis quadrifloris; culmo sub panicula vaginisque scabris; foliis carinatis. Mann. Crescit in pratis, pascuis, ad margines viarum Čechiae. fl. Jun. — Aug. 24. W. Mann.

octopetala. L. (Raibling in Steyermark. Sommerauer.) —
Drypis spinosa. L. (Günther.) — *Echinospermum squarrosum*. Reichenbach. (Prag. Kostelecky.) — *Eclypta erecta*. L. (Kostelecky.) — *Eleocharis acicularis*. (Prag. Mann.) —
ovata (Gráz. Speckmoser.) — *Ellisia Nyctelaea*. W. (Günther.) — *Encalypta vulgaris*. (an Manern um Cöln. Sehlmeyer.) —
affinis Hedw. vom Hrn. Dr. Fr. v. Braun ist *E. ciliata* Hedwig. Opiz. — *Endocarpon miniatum*. (Prag. Mann.) —
complicatum. (Mann.) — *Epilobium montanum ramosum*. Rochl. (Augesd bei Prag.) Bei diesem setzte ich zu einigen Exemplaren statt Rochl. Wallroth. Wagner. — *montanum trigonum*. Schrank. (Sudeten. Masner.) — *Epipactis ensifolia*. (Weimar. Thon.) — *Equisetum umbrosum*. Meyer vom Hrn. M. C. Mann ist *E. arvense*. L. Maly. — *Telmateja*. L. (Wien. Eisenstein.) — *palustre subsimplex*. Opiz. (Sudeten. Masner.) —
limosum caule simplici. (Prag. Mann.) — *Erica herbacea*. L. (Gráz. Speckmoser. Brühl bei Wien. Piwocki. Eisenstein.) —
Tetralix. L. (Bergedorf bei Hamburg. Lindenberg. Heideböden bei Cöln am Rhein. Sehlmeyer.) — *Erygeron graveolens*. L. (Chotek.) — *uniflorum*. L. (C. Bartenstein.) — *Erophila praecox*. De C. (Regensburg Stockar v. Neuform.) —
Erodium malacoides. L. (Sehlmeyer.) — *cicutarium*. L. (Cöln. Sehlmeyer.) — *chamaedryoides*. Cavan. (Speckmoser.) — *moschatum*. L. (Kostelecky. A. Bartenstein.) — *Ervum Lens nigrum*. (Kostelecky.) — *Eryngium tricuspidatum* L. vom Hrn. Professor Speckmoser ist *E. planum*. L. Maly. — *Eryssimum Cheiranthoides*. L. (Chotek.) — *Cheiranthus*. Pers. (Prag. Huzelmann.) — *odoratum*. Ehrh. (Wölf in Oesterreich. Reinegger.) — *longisiliquum*. Schleicher. (Kostelecky.) — *Euphorbia amygdaloides*. Willdenow. (Dornbach bei Wien. Eisenstein.) — *gerardiana*. Jacq. (Prag. Kostelecky.) — *palustris*. L. vom Hrn. Apotheker Hölzl ist *E. epithymoides*. Willd. Mann. —
racemosa. Tausch. (Prag. Mann.) — *saxatilis*. Jacq. (Brühl nächst Wien. Piwocki. Heiligenfrenz. Eisenstein.) — *verrucosa*. L. (Brigittenau bei Wien. Eisenstein.) — *exigua*. L. (Prag. Kostelecky.) — *falcata*. L. (Böheim. Mann.) — *helioscopia*. L. (Cöln am Rhein. Sehlmeyer.) — *platyphyllos*. L. (Kuchel-

bad. Masner.) — *terraccina*. L. (Kosteletzky.) — *litterata*. Jacq. (Kosteletzky.) — *picta*. L. (Kosteletzky.) — *micrantha*. Steph. (Kosteletzky.) — *Euphrasia minima*. Jacq. (Untersberg bei Salzburg. Hinterhuber.) — *nemorensis*. (Zena. Thon.) — *Fedia Auricula*. De C. (Mainz. Ziz.) — *Ferula graveolens*. Sprengl. (Masner.) — *Festuca capillata* Lam. oder *tenuifolia*. Schrad. vom Hrn. M. C. Kosteletzky ist wahrscheinlich *F. duriuscula*. Mann. — *delicatula*. Lagasc. (Kosteletzky.) — *Myurus*. L. (Sieben nächst Prag. Masner. Cöln am Rhein. Sehlmeyer.) — *pannonica*. Host. vom Hrn. Professor Wierzbicki ist *F. pallens*. Host. Mann. — *pinnataspicis glabris*. (Böhheim. Mann.) — *sylvatica*. Host. (Lausß. Burckhardt.) — *unioloides*. W. (Kosteletzky.) — *gracilis*. Schrad. (Cöln am Rhein. Sehlmeyer.) — *divaricata*. Desf. (Kosteletzky.) — *tenella*. W. (Kosteletzky.) — *Filago arvensis*. L. (Prag. Kosteletzky.) — *Flaveria contrajerva*. L. (Kosteletzky. Gerhard.) — *Fontinalis antipyretica*. (Böhheim. Mann. Böhmischaicha. Prochaska.) — *Fragaria elatior sterilis*. (Schlesien. Grabowsky.) — *Fucus concatenatus*. (Adriatisches Meer. C. Bartenstein.) — *vesiculosus*. (Adriatisches Meer. C. Bartenstein.) — *filum*. (Baltisches Meer. Mann.) — *subfuscus*. (Baltisches Meer. Mann.) — *Fumaria officinalis*. L. (Prag. Kosteletzky.) — *Fusidium septatum*. Kunze. (Prag. Masner.) — *Galinsoga parviflora*. Cav. (Kosteletzky.) — *trilobata*. Cav. (Kosteletzky.) — *Galium Mollugo pauciflorum*. Wallroth. (Muggeß bei Prag. Wagner.) — *pedemontanum*. Allion. (Kosteletzky.) — *tricorne*. With. (Mainz. Ziz.) — *Bocconi*. Allion. (Grätz. Speckmoser.) — *rotundifolium*. L. (Möls in Oesterreich. Reinegger. Lindenthal nächst Leipzig. Gerhard.) — *linifolium*. De C. (Grabowsky.) — *lucidum*. Allion. (Wien. Eisenstein.) — *parisiense*. L. (Neckar bei Cöln. Sehlmeyer.) — *purpureum*. L. (Maly.) — *Gaura biennis*. L. (Günther.) — *Genista procumbens*. W. et K. (Brünn. Hochstetter.) — *sibirica*. L. vom Hrn. Professor Reinegger ist *G. florida*. L. Maly. — *Gentiana acaulis*. L. (Baden in Oesterreich. Reinegger.) — *asclepiadea*. L. (Untersberg nächst Salzburg. Hinterhuber. Enderen. Wagner et Masner. Bodenwiese am Nie-

sengebirg. Benesch.) — *cruciata*. L. (Pentlochberg bei Salzburg. Hinterhuber. Gráz. Speckmoser.) — *pannonica*. Scopoli. (Untersberg bei Salzburg. Hinterhuber.) — *pumila*. L. (Gráz. Speckmoser.) — *utriculosa*. L. (Glaneg nächst Salzburg. Hinterhuber.) — *campestris*. L. (Böhmischaida bunzl. Hr. Prochaska.) — *uliginosa*. Willd. (Meflenburg. Kuřak.) — *Geranium macrorrhizon*. L. (Mann. — Mauern in Cöln. Sehlmeyer.) — *moschatum* vom Herrn M. C. Ritter von Eisenstein ist *Erodium cicutarium*. Willd. Mann. — *dissectum*. L. (Reinegger.) — *lucidum*. L. (Eisenach. Thon.) — *rotundifolium*. L. von mir ist *G. molle*. L. Weihe. — *carolinianum*. L. (Kostelecky.) — *sibiricum*. L. (Moschuer. Kostelecky.) — *Geropogon glabrum*. L. (Kostelecky.) — *Geum urbanum*. L. (Böhmischaida. Prochaska.) — *album*. Gmelin. (Weihe.) — *Glaucium luteum*. Scopoli. (Baden in Oesterreich. Reinegger.) — *Glechoma hederacea*. L. (Bartenstein.) — *hirsuta*. W. et K. (Baden. Reinegger und Rahlenberg nächst Wien. Eisenstein.) — *heterophylla*. Opiz.³⁸⁾ (Brigittenau bei Wien. Winkler.) — *Globularia vulgaris*. L. (Brühl bei Wien. Eisenstein.) — *Glycyrrhiza echinata*. L. (Mann.) — *Gnaphalium expansum*. Thunberg vom Hrn. Med. Assessor Günther ist *G. divaricatum*. Willd. Maly. — *fuscatum*. Pers. (Sudeten. Masner et Wagner.) — *luteo-album*. L. (Böheim. Mann.) — *arenarium*. L. (Wogfowic in Böheim. Chotek.) — *Stöchas*. L. (Adamowsky.) — *orientale*. L. (Kostelecky.) — *Grammitis Ceterach*. (Cöln am Rhein. Sehlmeyer.) — *Graphis Cerasi*. (Mann.) — *pulverulenta*. Achar. (Prag. Mann.) — *serpentina acerina*. (Breslau. Wimmer.) — *scripta pulverulenta*. (Prag. Mann.) — *Gratiola officinalis*. L. (Fruchte Orte bei Cöln. Sehlmeyer.) —

³⁸⁾ *Glechoma pilosa*; *stolonibus* reptantibus; *caulibus* floriferis erectis; *foliis* caulinis inferioribus reniformibus, minoribus, rotundato-crenatis, superioribus cordatis, grosse-serratis, majoribus; *floribus* foliis brevioribus, tubo calice multo longiore. Opiz. Quasi intermedia inter *G. hederacea*. L. foliis exacte reniformibus; rotundatecrenatis et *G. hirsuta*. W. et K. Opiz.

Gyalecta bryophila. Achar. (Prag. Mann.) — *Gymnostomum* rupestre vom Frn. D. Fr. v. Braun ist *G. aeruginosum*. Smith. Opiz. — *Gymnostyles anthemifolia*. Juss. (Maly.) — *Gypsophila repens*. L. (Einz. Brittinger.) — *paniculata*. L. (Chotek.) — *Gyrophora glabra*. Flörke von mir ist *Endocarpum miniatum*. Achar. Benesch. — *hirsuta*. Achar. (Prag. Mann. Brünn. Hochstetter.) — *Hedera Helix*. L. (Böhmischbunzl. Fr. Prochaska.) — *Hedypnois cretica*. (Kostelecky.) — *pendula* Balbis. (Kostelecky. Gerhard.) — *Hedysarum. Coronarium flore albo*. (Kostelecky.) — *Helianthemum Fumana*. (Türfenschanze in Wien. Winkler.) — *Helianthus tuberosus*. L. (Mann.) — *Heliophila amplexicaulis*. L. fil. (Maly.) — *Helleborus niger*. L. (Masner. Sehlmeier) — *Hesperis Chia*. Desf. (Kostelecky.) — *arenaria*. (Kostelecky.) — *Hieracium blattarioides*. L. (Raibling in Steyermark. Sommerauer.) — *candicans*. Tausch. (Troja nächst Prag. Masner.) — *glaucescens*. Besser. (Prag. Mann.) — *globuliferum*. Tausch. (Prag. Mann. Huzelmann.) — *Peleterianum*. Merat. (Donnersberg. Koch.) — *setigerum*. Tausch. (Podbaba. Masner und Ruchelbad nächst Prag. Benesch.) — *umbellatum*. L. (Eöln am Rhein. Sehlmeier.) — *umbellatum orthocaulon*. Wallroth. (Augeszd. Wagner. Prag. Masner.) — *virgatum*. Pursh. (Gerhard.) — *vulgare*. Tausch. (Podbaba. Masner.) — *dubium*. L. (Eöln. Sehlmeier.) — *murorum*. L. (Rahlenberg bei Wien. Kerndl.) — *porrifolium*. L. (Ruhlschneeberg in Oesterreich. Eisenstein.) — *staticaefolium*. Allion. (Reinegger.) — *amplexicaule*. L. (Maly.) — *bifurcum*. Bieberst. (Kostelecky.) — *umbellatum uniflorum*. (Lausß. Burckhardt. Regensburg. Stockar v. Neuform.) — *Hippocrepis comosa*. L. (Eisenach. Thon.) — *Holcus borealis*. Schrad. (Dornbach bei Wien. Eisenstein.) — *Hordeum coeleste*. Viborg. (Mann.) — *Hyacinthus orientalis*. L. (Speckmoser.) — *Hyosciamus Scopolia*. L. (Speckmoser. Burckhardt.) — *pallidus*. W. et K. (Prag. Masner.) — *Hypericum dubium*. Leers. (Sudeten. Wagner.) — *pulchrum*. L. (Eöln am Rhein. Sehlmeier.) — *Hypochaeris helvetica*. L. (Schlesien. Grabowsky. Grätz. Speckmoser.) — *Hypericum hircinum*. L. (Chotek.) — *Kohlium*. Sprengl. (Lo-

bosig Leitmer. Kr. Neumann.) — *Hypnum umbratum*. Ehrh. (Zsergebirge. Opiz.) — *myosuroides*. (Eöln. Sehlmeyer.) — *fluviatile*. L. (Reinegger.) — *aduncum*. (Reinegger.) — *mol-luscum*. (Reinegger.) — *plumosum*. (Reinegger.) — *denti-culatum*. (Reinegger.) — *Hyssopus orientalis*. Adam. (Koste-
 telecky.) — *Hysterium conigenum*. (Prag. Masner.) — *co-nigenum rimosum*. (Prag. Masner.) — *Jasminum odoratis-simum*. L. (Huzelmann.) — *Iberis semperflorens*. L. (Sehl-meyer.) — *odorata*. L. (Kostelecky.) — *Ilex aquifolium*. L. (Minden. Weihe.) — *Imperatoria pimpinelloides*. Nees. (Eöln am Rhein. Sehlmeyer.) — *Inula arabica*. L. (Koste-
 lecky.) — *Oculus christi*. L. (Leopoldsberg bei Wien. Wink-
 ler.) — *Iris pumila*. L. (Pöhlauerberge in Mähren. Hoch-
 stetter.) — *Isatis tinctoria*. L. (Michele nächst Prag. Masner.)
 — *Isolepis fluitans*. (Münster. Böanninghausen.) — *Isopyrum*
thalictroides. L. (Zwittathal und Adamsthal bei Brünn. Hoch-
 stetter.) — *sumarioides*. L. (Kostelecky.) — *Juncus maximus*.
 Rez. (Eöln am Rhein. Sehlmeyer.) — *subverticillatus*. Wulfen.
 (eb. Sehlmeyer.) — *filiformis*. L. (Lausig. Burckhardt.) — *syl-vaticus*. Roth. (Zauerburg. Reinegger.) — *triglumis* L. vom Frn
 M. D. Carl ist *J. trifidus*. L. Weihe. — *Jungermannia Baueri*.
 Martius. (F. v. Braun.) — *Funkii* W. et M. (Georgswald Leit-
 merig. Kr. Neumann.) — *pallesceus rivularis*. Schrader. (Eöln
 am Rhein. Sehlmeyer.) — *reptans*. L. (Eöln. Sehlmeyer.) —
dilatata. L. Eöln. Sehlmeyer.) — *tamariscifolia*. L. (Reineg-
 ger.) — *Tomentella*. Ehrhart. (Untersberg bei Salzburg.
 Hinterhuber.) — *graveolens*. (C. Bartenstein.) — *Juniperus*
nana. Willd. (Wiesenbergergebirg in Mähren. Hochstetter.)
 — *Kobresia caricina*. (Gráz. Speckmoser.) — *Kochia arena-
 ria*. W. et K. (Sandige Weiden bei Bisenz und Göding in
 Mähren. Hochstetter.) — *hyssopifolia*. Roth. (Kostelecky.)
 — *sericea*. Schrader. (Chotek.) — *prostrata*. (Mautnitzer
 Gutweide Brünn. Kr. Hochstetter.) — *Kölleria cristata* con-
 tigua. P. (Jena. Gerhard.) — *mollis*. Mann. ²⁹⁾ (Böhmeim.

²⁹⁾ *Kölleria panicula* spicata, basi interrupta; *flosculis* 3-4
 floris; *culmo* sub panicula pubescenti; foliis ciliato-

Manu.) — phleoides. P. (Kosteletzky.) — *Lactuca sagittata*. W. et K. vom Hrn. Professor Reinegger ist *L. scariola*. L. Maly. — *saligna*. L. (Prag. Mann.) — *Laelia cochlearioides*. (Saaten bei Eöln am Rhein. Sehlmeier.) — *Lamium garganicum*. L. (Grabowsky. Sehlmeier.) — *Lantana nivea*. Vent. (Sehlmeier.) — *Laserpitium prutenicum*. L. (Laufz. Burckhardt.) — *latifolium*. L. (St. Profop bei Prag. Mann.) — *Lathraea squamaria*. L. (Tornau. Reinegger.) — *Lathyrus sylvestris*. L. (Einz. Brittinger.) — *Lavatera arborea*. L. (Masner.) — *Lecanora albella*. (Prag. Mann.) — *albella umbilicata*. Achar. (Prag. Mann.) — *aurantiaca*. Flörke. (Breslau. Wimmer.) — *cerina gilva*. (Böheim. Mann.) — *detrita*. Achar. Prag. Mann.) — *glaucoma*. Achar. (Prag. Mann.) — *Hageni*. (Breslau. Wimmer.) — *Hageni crenulata*. Achar. (Prag. Mann.) — *saxicola*. Achar. (Prag. Mann.) — *subfusca atrypaea*. Ach. (Prag. Mann.) — *vitellina aurella*. Achar. (Mann.) — *angulosa*. Ach. (Breslau. Wimmer.) — *varia*. (Breslau. Wimmer.) — *subfusca*. (Mann.) — *miniata*. (Bischoberg. Masner. Prag. Benesch.) — *subfusca horiza*. (Prag. Mann.) — *Lecidea anomalla cyrtella*. (Breslau. Wimmer.) — *atrovirens*. Achar. (Prag. Mann.) — *corticolla*. Ach. (An Bäumen bei Regensburg. Stockar v. Neuform) — *elaeochroma*. (Prag. Mann.) — *luteola*. Achar. (Breslau. Wimmer.) — *microphylla*. Achar. (Prag. Mann.) — *parasema*. (Breslau. Wimmer.) — *parasema athroa*. (Mann.) — *parasema punctata*. (Prag. Mann.) — *pezizoides*. (Prag. Mann.) — *sulphurea*. Achar. (Prag. Mann.) — *icmadophila*. (Großaupa im Riesengebirg. Benesch.) — *vesicularis*. (Prag. Mann.) — *geographica*. (Prag. Mann.) — *Leersia oryzoides*. W. (Rieße in der Laufz. Burckhardt.) — *Lemna minor*. L. (Eöln. Sehlmeier.) — *polyrrhiza*. L. (Eöln. Sehlmeier.) — *Leontodon laevigatus*. W. (Trockene Hügel und Raine bei Brünn. Hochstetter.) — *taraxacoides*. Hoppe et Hornschuh. (Herrnhals bei Wien. Winkler.) — *Lepidium petraeum*. L. (Gainsfarn in Oesterreich. Reinegger.) — *sati-*

villosis. Mann. Crescit in sylvis Čechiae; floret Jun. Jul. Aug. 24. Mann.

vum. L. (Adamowsky.) — alpinum. L. (A. Bartenstein.) — *Lepraria botryoides*. (An *Populus dilatata*. Pers. bei Prag. Benesch.) — cinereo-sulphurea. (Mann.) — flava. Achar. (Prag. Mann.) — leiphema. Achar. (Prag. Mann.) — olivacea. Achar. (Prag. Mann.) — rubens. (Prag. Mann.) — chlorina. (Basaltfelsen Rabstein auf dem Tollsberg bei Wartenberg bunzl. lauer Kr. Benesch.) — byssoidea. (Prag. Mann.) — *Lichen coccigerus*. (Reinegger.) — fagineus. (Reinegger.) — farinaceus. (Reinegger.) — rangiformis. (Reinegger.) — *Lilium bulbiferum*. L. (C. Bartenstein. Jena. Thon.) — Martagon. L. (Böhmischaida. bunzl. Kr. Benesch.) — *Linaria calycina* vom Hrn. M. C. Kosteletzky ist *Orontium arvense*. Grabowsky. — juncea vom Hrn. Prof. Speckmoser ist L. bipartita. Maly. — spuria. (Teffenburg. Sehlmeyer.) — tristis. (Kosteletzky.) — bipartita. Vent. (Kosteletzky.) — littoralis. Bernh. (Kosteletzky.) — *Linum austriacum*. L. (Donauinsel bei Möß in Oesterreich. Reinegger.) — narbonense. L. (Kosteletzky.) — *Lobelia pubescens*. Aiton. (Chotek.) — *Lolium arvense*. Withering. (Kesthely in Ungarn. Wierzbicki.) — maximum. Willd. (Kosteletzky.) — *Lonicera coerulea*. L. (Sehlmeyer.) — parviflora. Lamark. (Sehlmeyer.) — nigra. L. (Sehlmeyer.) — alpigena. L. (Schweiz. Sehlmeyer.) — sempervirens. L. (Kosteletzky.) — *Lotus corniculatus hirsutus*. (Wien. Eisenstein.) — coimbrensis. Willd. (Kosteletzky.) — *Lunaria annua*. L. (Sehlmeyer.) — *Lupinus angustifolius*. L. (Kosteletzky.) — hirsutus. L. (Maly.) — luteus. L. (Chotek.) — *Luzula erecta*. (Prag. Kosteletzky.) — albida cuprina. Rochl. (Sudeten. Wagner et Masner.) — *Lychnis sylvestris*. Schukr. (Grätz. Speckmoser.) — dioica. Willd. (Göln am Rhein. Sehlmeyer.) — *Lycopersicum esculentum*. Miller. (Chotek.) — *Lycopodium Selago*. (Böhmischaida bunzl. Kr. Prochaska.) — annotinum. (Zackenfall im Riesengebirg. Wagner et Masner.) — selaginoides. (Untersberg bei Salzburg. Hinterhuber.) — complanatum. (Münster. Weihe. Heideboden bei Rheinbreitbach. Sehlmeyer.) — recurvum. (Jäschfenberg. bunzl. Kr. Prochaska. Tuhau bunzl. Kr. Maly.) — *Madia mellosa*. Mol. (Kosteletzky.) — *Mahernia incisa*. Jacq. (Sehlmeyer.) — *Malaxis paludosa*. L. (Pinzgauer Moor. Sauter.) —

Malva americana. L. (Kosteletzky.) — *decumbens*. Willd. (Kosteletzky.) — *peruviana*. L. (Kosteletzky.) — *moschata*. L. (Kosteletzky.) — *parviflora*. L. (Kosteletzky.) — *Manulea foetida*. Pers. (Kosteletzky. Sehlmeier.) — *Marrubium peregrinum*. L. (Ejciž brunn. Rr. Hochstetter.) — *Pseudo-Dictamnus*. L. (Kosteletzky.) — *hirsutum*. Willd. (Kosteletzky.) — *astracanicum*. Jacq. (Kosteletzky.) — *Medicago ciliaris*. Willd. (Maly. Kosteletzky.) — *distans*. Poir. (Gerhard.) — *intertexta*. Willd. vom Hrn. Prof. Hinterhuber und Hrn. Apotheker C. Bartenstein ist *M. Echinus*. De C. (*M. intertexta*. Allion.) aber nicht die Willdenow'sche Pflanze. Maly. — *Murex*. Willd. (Sehlmeier.) — *Terebellum*. L. (Kosteletzky.) — *tortuosa*. Schwaegr. (Kosteletzky.) — *turbinata*. Willd. (C. Bartenstein.) — *uncinata*. Fischer. (C. Bartenstein.) — *apiculata*. Willd. (Maly. C. Bartenstein.) — *denticulata*. Willd. (C. Bartenstein.) — *maculata*. Sibth. (Sehlmeier.) — *nigra*. Willd. (Sehlmeier.) — *radiata*. L. (Weihe.) — *rigidula*. Willd. (Kosteletzky. C. Bartenstein.) — *scutellata*. Lam. (Maly.) — *tribuloides*. Lam. (Kosteletzky. Sehlmeier.) — *tuberculata*. Willd. (Maly.) — *procumbens*. Besser. (Prag. Kosteletzky.) — *granadensis*. Willd. (Kosteletzky.) —

Auch kann ich alle erschienenen, naturhistorischen Schriften, und Sammlungen verschaffen, und will mich gerne für deren Absatz interessiren, ohne ein Prozent anzusprechen, wenn ich in keine Unkosten versetzt werde, welches sowohl den Verfassern, Herausgebern, Verlegern und Commissionärs von derlei naturhistorischen, erlaubten Werken und Sammlungen zur Nachricht dient.

Schließlich muß ich bemerken, daß ich auch verbesserte Diagnosen, vollständige Beschreibungen, bis jetzt unvollständig oder noch gar nicht beschriebener oder verkannter Gewächse, so wie einzelne, eigene Beobachtungen von jenen Pflanzen, welche in Mehrzahl eingeliefert werden, in diesen Verzeichnissen mit Vergnügen aufnehmen will, wenn sie kostenfrei an mich gelangen.

Prag, den 9. März 1824.

P. M. Dpiž.

Erstes Verzeichniß

jener Insekten, welche unter denselben Bedingnissen wie die Pflanzen bei P. M. Opiz zum Tausch vorrätig sind.

Abax ovalis. (Kupido.) — *Agonum clypeatum.* Knoch vom Hrn. Landschaftsbuchhaltungsbeamten Kupido ist *A. viduum* v. *nigra*. J. D. Preissler — *meridianum* von ebendenselben ist ein *Trechus*, steckt bei mir als *Agonum cruciger*. Fabr. und ist mit *Carabus meridianus* L. einerlei. J. D. Preissler — *6punctatum.* (Schurz. A. Preissler.) — *Akis reflexa.* Fabr. (Aegypten. Sieber.) — *Aleochara fuscipes.* (Zbirow. J. D. Preissler.) — *Amara aulica.* (J. D. Preissler.) — *Anaspis cana.* J. D. Preissler. (Zbirow. J. D. Preissler.) — *Anchomenus prasinus.* (Zbirow. J. D. Preissler.) — *Aphanisticus viridis.* (Zbirow. J. D. Preissler.) — *Aphodius carbonarius.* Sturm. vom Hrn. Kupido ist der wahre *A. niger*. Illiger. Schönherr hat hier eine Verwirrung gemacht. Sein *A. carbonarius* gehört zu *A. ater*, welcher dem *A. niger* gleicht, jedoch kürzer ist, und die 3 Kopfhörner viel deutlicher sichtbar hat. J. D. Preissler. — *simetarius.* (Schurz. A. Preissler.) — *foetens.* Fabr. (Kupido.) — *fossor.* (Schurz. A. Preissler.) — *imundus.* (Kupido.) — *inquinatus.* (Zbirow. J. D. Preissler.) — *Apion aeneum.* (Zbirow. J. D. Preissler.) — *apricans.* Herbst. (Zbirow. J. D. Preissler.) — *Craccaae.* Kb. (Zbirow. J. D. Preissler.) — *flavipes.* (Zbirow. J. D. Preissler.) — *Apis longicornis.* (Schurz. A. Preissler.) — *Aranea domestica.* (Schurz. A. Preissler.) — *Ateuchus ovatus.* (Opiz.) — *variolosus.* (Triefl. J. D. Preissler.) — *Attelabus Betulae.* (Neuninger.) — *Napus.* (Zbirow. J. D. Preissler.) — *violaceus.* (Zbirow. J. D. Preissler.) — *Badister bipustulatus.* (Kupido.) — *Bembidium celere.* (J. D. Preissler.) — *flavipes* vom Hrn. Kupido ist *Elaphrus flavipes*. J. D. Preissler. — *undatum* vom Hrn. Kupido ist *B. ustulatum* und varirt sehr und manchem Irrthum unterworfen. J. D. Preissler. — *Bombyx Caja.* (Schurz. A. Preissler.) — *dispar.* (Schurz. A. Preissler.) — *Bostrychus crispatus.* (J. D. Preissler.) — *dactyliperda.* (J. D. Preissler.) — *Laricis.* (J. D. Preissler.) — *limbatus.* (J. D. Preissler.) — *Tiliae.*

(J. D. Preifsl.) — *Brachynus explodens*. (J. D. Preifsl.) — *Bruchus brasiliensis*. Preifsl. (J. D. Preifsl.) — *Buprestis chrysostigma*. (Kupido.) — 2. *guttata*. (Kupido.) — *Byrrhus varius*. (J. D. Preifsl.) — *Calandra Oryzae*. (J. D. Preifsl.) — *Callidium hafniense*. (Kupido.) — *Calosoma sycophanta*. (Schurz. A. Preifsl.) — *Cantharis abdominalis* vom Hrn. M. C. Kuřak ist *C. fusca* J. D. Preifsl. — *clypeata*. (J. D. Preifsl.) — *fusca*. (Prag. Austerlitz.) — *Melanura*. (Nenning.) — *obscura*. Illiger. (Nenning.) — *obscura*. L. (J. D. Preifsl.) — *testacea*. (J. D. Preifsl.) — *vesicatoria*. (Prag. Kuřak.) — *Carabus agrestis*. Creuzer. (Kupido.) — *auronitens*. (Schurz. A. Preifsl.) — *cyaneus*. Fabr. (Schurz. A. Preifsl.) — *granulatus*. (Prag. Opiz.) — *ruficornis*. (Opiz.) — *scabriusculus* vom Hrn. Kupido ist *C. convexus*. J. D. Preifsl. — *striola* vom Hrn. Metaphysiker Masner ist *Platysma nigrum*. J. D. Preifsl. — *marginatus*. (Prag. Kuřak.) — *Centrotus cornutus*. (Regensburg. Herrich.) — *Cerambyx moschatus*. (Schurz. A. Preifsl.) — *textor*. (Schurz. A. Preifsl.) — *Cercopis sanguinolenta*. (Prag. Benesch.) — *Cerylon politum*. (J. D. Preifsl.) — *Chrysomela aeneae*. (Schurz. A. Preifsl.) — *alternans*. Creuzer. vom Hrn. Kupido ist *C. Megerlei*. Fabr. und bloß var. der *C. cerealis*. Uebrigens ist *C. alternans* und *Megerlei* ein und dasselbe Insekt. J. D. Preifsl. — *collaris*. (Nenning.) — *littura*. (Schaeffer.) — *polita*. (A. Preifsl.) — *Populi*. (Kuřak.) — *ropunctata*. Fabr. (Schurz. A. Preifsl.) — *2vittata*. (Nenning.) — *vitellina*. (Kuřak.) — *Cimex agathinus*. (Herrich.) — *coeruleus*. (Herrich.) — *dissimilis*. (Herrich.) — *haemorrhoidalis*. (Herrich.) — *juniperinus*. (Herrich.)

Ich ersuche die Insekten hochzuспеißen, jedem Insekt ein kleines Zettelchen mit dem Namen des Insekts, des Autors, des Fangorts und des Finders beizustecken, den Transport alphabetisch zu reihen, und nie mehr als 25 Exemplare einer verlangten Art einzuliefern.

Prag den 14. März 1824.

P. M. Opiz.